

A INCIDÊNCIA DE IDÉIAS SUICÍDAS NO PACIENTE RENAL CRÔNICO

Maria Luiza Karman de Bueno Gizzi, Vicente, R.B.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, Curitiba, Paraná, Brasil.

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) pela PUCPR

OBJETIVOS: Verificar a incidência de idéias suicidas em pacientes em tratamento de hemodiálise e quais variáveis associadas a mesma. **MÉTODOS:** Foram aplicadas a escala de Ideação Suicida de Beck e uma Entrevista contendo dados Sócio-Econômicos e Clínicos em 127 pacientes hemodialíticos na cidade de Curitiba. **RESULTADOS:** Os resultados apontam que 23% dos pacientes apresentam ideação suicida. Desses, 43% não tem religião ou não são praticantes. A ideação está mais presente em pessoas com mais de 50 anos (65%), homens (52%) e com diagnóstico de depressão antes e/ou após o tratamento(57%). **CONCLUSÕES:** A literatura sugere que pacientes renais crônicos tem uma incidência maior de depressão que a população geral, estando de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. Uma das complicações da depressão é o suicídio.